

Priorités, objectifs et plans axés sur le patient

1er juin 2019

Objectifs à court terme	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter un dentiste • Faire les démarches nécessaires pour obtenir des pièces d'identité • Veut une coupe de cheveux avant les pièces d'identité • Consulter un psychiatre par rapport à la consommation de stimulants, le patient est intéressé par un traitement à long terme (dexedrine spansule¹) • Considère une thérapie de remplacement de la nicotine et souhaite éventuellement essayer l'inhalateur de nicotine • Faire une demande pour une carte de statut • Réduire sa consommation d'opioïde illicite • Réduire les risques de surdose • Essai d'un TAO par voie orale (morphine orale à libération lente comme le Kadian)
Objectifs à long terme	<ul style="list-style-type: none"> • Cesser de partager ses aiguilles • Passer plus de temps en famille • Cesser de s'injecter des opioïdes illicites • Obtenir ses pièces d'identité et sa carte de statut • Obtenir des soins dentaires et éventuellement des prothèses • Travailler plus (pas encore prêt pour un emploi à temps plein) • Traiter l'hépatite C
Plans et stratégies pour atteindre les objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Reporter; peut aider à la planification si le patient demande de l'aide pour atteindre l'un des objectifs énumérés ci-dessus.
Succès	<ul style="list-style-type: none"> • Se loger • Travailler à temps partiel • Se présenter à la clinique de TAOi 2 à 3 fois par jour

Santé et fonctionnement social (à partir de janvier 2019) :

Santé psychologique 15/20

Santé physique 12/20 (pourrait s'améliorer avec un traitement de l'hépatite C)

Qualité de vie globale 15/20

¹ Nuijten M, Blanken P, van de Wetering B, Nuijten B, van den Brink W, Hendriks VM. Sustained-release dexamfetamine in the treatment of chronic cocaine-dependent patients on heroin-assisted treatment: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet (Londres, Angleterre)*. 2016;387(10034):2226-2234. 10.1016/S0140-6736(16)00205-1

CECI EST UN EXEMPLE DE PLAN DE TRAITEMENT
CE FORMULAIRE N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE CLINIQUE.